

令和 7 年度における所定疾患施設療養費算定及び実施状況							
	件数	日数	病名	投薬	検査	注射	処置等
R7.4	15	7	尿路感染症・肺炎	カロナール坐剤400m g 1 P × 屯/5	胸部C T、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g × 7、生食100m l × 7	
		7	肺炎	レボフロキサシン細粒10%300mg1 × M/3 T ツロブテロールテープ2mg1枚/7 T	胸部C T、胸部X P、検体検査（血液）	レボフロキサシン注500m g × 2	
		7	肺炎	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/4 T カルボシステイン錠500m g 3錠3 × N/5 T	胸部C T	検体検査（尿・血液）	
		3	肺炎	カロナール坐剤400m g 1 P × 屯/5	胸部C T、検体検査（血液）	レボフロキサシン注500m g × 3	
		5	誤嚥性肺炎	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/5 T	胸部C T、検体検査（血液）		
		7	肺炎	カロナール錠200m g 2錠1 × 屯/5回	胸部C T、胸部X P、検体検査（血液） 喀痰培養	メロペネム注0.5 g × 1 × 2、生食100m l × 6 メロペネム注0.5 g × 2 × 1、生食100m l × 2 × 1 ロセフィン2 g × 4	酸素吸入
		7	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	胸部C T、胸部X P、腹部C T 腹部X P、腹部エコー、検体検査（尿・血液）	ゾジン注4.5 × 1、ゾジン注4.5 × 2 × 4 生食100m l × 2、生食100m l × 2 × 4 セフメタゾン注 × 1	
		6	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c 3 × N/5 T			軟膏処置
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（尿・血液）		
		5	肺炎	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/2 T	胸部X P、検体検査（血液）	レボフロキサシン注500m g × 3	
		5	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/5 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（尿・血液）		
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/3 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	胸部X P、検体検査（尿・血液）		
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/6 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g × 1、生食100m l × 1	
		6	尿路感染症・誤嚥性肺炎	カルボシステイン錠500m g 3錠3 × N/3 T レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/6 T	検体検査（尿・血液）		酸素吸入
		6	肺炎		胸部X P、検体検査（血液）	ロセフィン2 g × 6、生食100m l × 6	
R7.5	2	6	肺炎		胸部X P、検体検査（血液）	ロセフィン2 g × 6、生食100m l × 6	酸素吸入
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T	検体検査（尿）		
R7.6	7	5	肺炎	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/3 T	胸部X P、検体検査（血液）	ロセフィン1 g × 2、生食100m l × 2	
		4	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/4 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（尿・血液）		
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T	検体検査（尿）		
		7	慢性心不全の増悪				酸素吸入（7日）
		3	蜂窩織炎	カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（血液）	セファゾリンN a 注1 g × 3	
		8	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 2 c 2 × M A/7 T	検体検査（血液）		
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（尿・血液）		
R7.7	7	10	肺炎		胸部C T、胸部X P、検体検査（血液）	メロペネム注0.5 g × 11、生食100m l × 11	酸素吸入
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/5 T	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g × 2、生食100m l × 2	バルーン留置
		5	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/5 T	検体検査（尿・血液）		
		7	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c 3 × N/7 T カロナール錠200m g 2錠1 × 屯/10回			
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T	コロナ抗原検査、検体検査（尿）		
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T カロナール坐剤200m g 1 P × 屯/5回	検体検査（尿）		
		7	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c 3 × N/7 T カロナール錠200m g 2錠1 × 屯/10回	検体検査（尿・血液）		
R7.8	8	4	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/4 T	検体検査（尿・血液）		
		7	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c 3 × N/7 T	検体検査（血液）		
		7	尿路感染症		インフルエンザ抗原、検体検査（尿・血液）	スルバシリン注1.5 g × 2 × 7、生食100m l × 2 × 7	
		5	蜂窩織炎	カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	検体検査（血液）	セファゾリンN a 注1 g × 1 × 2 セファゾリンN a 注1 g × 2 × 3	
		8	蜂窩織炎	オーグメンチン錠250m g 2錠2 × M A/2 T セファクロルカプセル250m g 3 c 3 × N/3 T セファクロルカプセル250m g 2 c 2 × M A/2 T	胸部X P、腹部X P、検体検査（尿・血液）	エクサシン注200m l × 4	
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/7 T	検体検査（尿）		
		6	尿路感染症		検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g × 6、生食100m l × 6	
		7	肺炎		胸部X P、検体検査（血液）	メロペネム注0.5 g × 6、生食100m l × 6	酸素吸入

R 7.9	8	5	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1× A/5 T	検体検査（尿）		
		7	蜂窩織炎	サワシリンカプセル250m g 4 c 分4/7 T	検体検査（尿・血液）		
		6	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1× 屯/5回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×6、生食100m l ×6	
		7	尿路感染症	カロナール坐剤200m g 1 p 1× 屯/5回	胸部X P、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×7、生食100m l ×7	
		8	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c × N/7 T	検体検査（尿・血液）		
		5	尿路感染症	カロナール坐剤200m g 1 p 1× 屯/3回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×2、ロセフィン1 g ×3 生食100m l ×5	
		9	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/3 T	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×6、生食100m l ×6	
		7	尿路感染症	カロナール坐剤400m g 1 p 1× 屯/5回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×7、生食100m l ×7	
R 7.10	5	6	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c × N/5 T			
		6	尿路感染症		胸部C T、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×3、生食100m l ×3 メロペネム注0.5 g ×2×3、生食100m l ×2×3	
		7	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c × N/7 T			
		3	肺炎	カロナール錠200m g 2錠1× 屯/11回	胸部C T、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×2、生食100m l ×2 メロペネム注0.5 g ×2×1、生食100m l ×2×1	
		7	蜂窩織炎	カロナール錠200m g 2錠1× 屯/10回 バナン錠100m g 2錠2× M A/7 T			軟膏処置
R 7.11	9	10	尿路感染症	フロモックス錠100m g 2錠2× M A/5 T カロナール錠300m g 1錠1× 屯/5回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン1 g ×4、生食100m l ×4	
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/6 T	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×1、生食100m l ×1	
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/3 T	インフルエンザ抗原、コロナ抗原検査、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×4、生食100m l ×4	
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/7 T	胸部X P、検体検査（尿・血液）		
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/3 T	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×4、生食100m l ×4	
		8	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1× 屯/5回 カロナール坐剤200m g 1 P 1× 屯/5回	胸部X P、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×2、生食100m l ×2 メロペネム注0.5 g ×2×5、生食100m l ×2×5	
		7	肺炎	バナン錠100m g 2錠2× M A/6 T レボフロキサシン錠500m g 1錠1× A/3 T	胸部C T、インフルエンザ抗原、コロナ抗原検査 検体検査（尿・血液）		
		6	肺炎	レボフロキサシン錠500m g 1錠1× A/6 T ツロブテロールテープ2mg1枚/6 T	胸部C T、検体検査（血液）		
		7	誤嚥性肺炎	オーグメンチン錠250m g 3錠3× N/7 T サワシリンカプセル250m g 3 c 3× N/7 T カロナール錠500m g 3錠3× N/3 T カルボシステイン錠500m g 3錠3× N/7 T カロナール錠500m g 1錠1× 屯/10回	胸部C T、胸部X P		
R 7.12	7	7	誤嚥性肺炎		胸部C T、検体検査（血液）	メロペネム注0.5 g ×1、生食100m l ×1 メロペネム注0.5 g ×2×7、生食100m l ×2×7	酸素吸入
		7	蜂窩織炎	セファクロルカプセル250m g 3 c × N/7 T	検体検査（尿・血液）		
		5	尿路感染症		検体検査（尿）	ワイスタール注1 g ×1、ワイスタール注1 g ×2×4 生食100m l ×1、生食100m l ×2×4	
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/3 T	検体検査（尿・血液）	エクサシン注200m l ×4	
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 2錠2× M A/3 T	検体検査（尿・血液）	ワイスタール注1 g ×4、生食100m l ×4	
		6	蜂窩織炎	ケフラールカプセル250m g 3 c 3× N/5 T			
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/3 T カロナール坐剤200m g 1 P 1× 屯/1回	腹部C T、腹部エコー、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×7、生食100m l ×7	
R 8.1	6	8	蜂窩織炎	ケフラールカプセル250m g 3 c 3× N/7 T	検体検査（血液）		
		6	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1× 屯/1回	検体検査（尿・血液）、尿培養感受性検査	エクサシン注200m l ×6	
		7	肺炎	フロモックス錠100m g 3錠3× N/7 T	胸部C T、検体検査（血液）		
		7	蜂窩織炎	ケフラールカプセル250m g 3 c 3× N/7 T カロナール錠200m g 2錠2× 屯/10回 プロスタンディン軟膏×5			
		7	蜂窩織炎	ケフラールカプセル250m g 3 c 3× N/7 T			洗浄穿刺処置 軟膏処置
		8	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3× N/6 T カロナール坐剤200m g 1 P 1× 屯/5回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×1、生食100m l ×1	
		10	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1× 屯/10回	検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×2、生食100m l ×2 メロペネム注0.5 g ×1、生食100m l ×1 メロペネム注0.5 g ×2×8、生食100m l ×2×8	
		8	尿路感染症	カロナール錠300m g 1錠1× 屯/5回	胸部X P、腹部エコー、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g ×8、生食100m l ×8	
		8	尿路感染症	オーグメンチン錠250m g 3錠3× N/7 T	胸部X P、検体検査（尿・血液）	エクサシン注200m g ×3	
		9	尿路感染症	セルベックス細粒10%1.5 g 3×/8 T オーグメンチン錠250m g 3錠3× N/8 T	検体検査（尿・血液）		

R 8.2	11			サワシリンカプセル250m g 3 c 3 × N/8 T ラシックス錠20m g 1錠1 × M/7 T			
		7	尿路感染症	レボフロキサシン錠500m g 1錠1 × A/7 T	検体検査（尿・血液）		
		9	尿路感染症	バクタ顆粒4.0 g 2 × M A/8 T	検体検査（尿）		
		1	肺炎	カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/1回	胸部C T、胸部X P、検体検査（血液）	ヴィーンD 輸液500m l × 1	酸素吸入
		9	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/3 T	胸部X P、検体検査（尿・血液）	ロセフィン2 g × 5、生食100m l × 5	
		7	尿路感染症		検体検査（尿・血液）	メロペネム注0.5 g × 2 × 7、生食100m l × 2 × 7	
		5	尿路感染症	カロナール坐剤200m g 1 P 1 × 屯/1回	検体検査（尿）	ロセフィン1 g × 5、生食100m l × 5	
		6	尿路感染症	ファロム錠200m g 3錠3 × N/5 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/5回	胸部X P、検体検査（尿・血液）		
R 8.3	8	8	肺炎		胸部X P、検体検査（血液）	ロセフィン2 g × 8、生食100m l × 8	
		3	尿路感染症	オーグメンチン錠250m g 3錠3 × N/2 T	胸部C T、胸部X P、検体検査（尿・血液）	エクサシン注200m g × 2	
		6	肺炎		胸部X P、検体検査（血液）	ロセフィン2 g × 3、生食100m l × 3 ロセフィン1 g × 3、生食100m l × 3	
		7	尿路感染症	カルボシステイン錠500m g 3錠3 × N/3 T カロナール坐剤400m g 1 P 1 × 屯/1回	胸部C T、検体検査（尿・血液）	レボフロキサシン注500m g × 3 メロペネム注0.5 g × 1、生食100m l × 1 メロペネム注0.5 g × 2 × 3、生食100m l × 2 × 3	
		7	尿路感染症	フロモックス錠100m g 3錠3 × N/4 T クラリスロマイシン200m g 2錠2 × M A/3 T カロナール錠300m g 1錠1 × 屯/7回		エクサシン注200m g × 5	
		6	肺炎	カロナール坐剤200m g 1 P 1 × 屯/5回	胸部C T、胸部X P、検体検査（尿・血液） 心電図	ネオフィリン注250m g × 1 ネオフィリン注250m g × 0.5 × 4 レベチラセタム注500m g × 2 × 5 ロセフィン2 g × 5、生食100m l × 5	酸素吸入 喀痰吸引
		7	蜂窩織炎	ケフラールカプセル250m g 3 c 3 × N/7 T			
		3	尿路感染症	オーグメンチン錠250m g 3錠3 × N/3 T	検体検査（尿）		
合計	93	623	肺炎 21件126日 尿路感染症 52件362日 蜂窩織炎 19件128日 慢性心不全の増悪 1件7日				